



# ultra<sup>o</sup>lax

Bisacodilo 5mg

LAXANTE  
COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES

## FORMULA CUALI-CUANTITATIVA:

Cada comprimido recubierto contiene

Bisacodilo	5,0 mg
Lactosa Monohidrato	50,0 mg
Almidón de Maíz	50,0 mg
Celulosa microcristalina	8,0 mg
Amarillo de Quinoleína	2,0 mg
Estearato de Magnesio	2,5 mg
Eudragit L 100	4,0 mg

Venta Libre  
INDUSTRIA ARGENTINA

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Laxante.

### INDICACIONES

ULTRALAX se encuentra indicado en el tratamiento sintomático de corta duración en caso de constipación ocasional cuando las medidas higiénico-dietéticas han fracasado.

### DOSIS

Edad Dosificación: Adultos y niños mayores de 12 años 1 comprimido por día (5 mg).

### ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

#### Vía de administración oral

Modo de administración: Los comprimidos poseen un recubrimiento especial y por ello no deben ingerirse junto con leche o antiácidos. Los comprimidos deben tomarse por la noche para que se produzca una evacuación a la mañana siguiente, sin masticar y con líquido suficiente.

**“Si los síntomas (constipación)/malestar o dolencia persisten por mas de 48 horas o empeoran consulte a su medico.”**

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Igual que con todos los laxantes, ULTRALAX no debe tomarse con continuidad diariamente durante largos periodos. Si necesita tomar diariamente laxantes, debería investigarse la causa del estreñimiento.

El uso excesivo prolongado puede producir un desequilibrio de los electrolitos e hipopotasemia y puede precipitar la aparición de un estreñimiento de rebote. No tome este medicamento si tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre. No se debe tomar dentro de las 2 horas de haber tomado cualquier otro medicamento.

### CONTRAINDICACIONES

ULTRALAX esta contraindicado en pacientes con íleo, obstrucción intestinal, cuadros abdominales quirúrgicos

agudos como apendicitis aguda, enfermedades inflamatorias agudas del intestino y en caso de deshidratación grave. Dolor abdominal de causa desconocida. Niños menores de 12 años. ULTRALAX se encuentra también contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la fórmula.

### **REACCIONES ADVERSAS**

En casos raros se ha informado sobre molestias abdominales (dolor) y diarrea. Riesgo de hipokalemia. Nauseas. Vómitos.

### **INTERACCIONES**

No se recomienda el uso simultáneo de diuréticos corticoides con este producto ya que puede aumentar la sensibilidad a medicamentos utilizados para el corazón.

La administración simultánea de antibióticos de amplio espectro puede reducir la acción laxante de ULTRALAX.

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

### **SOBREDOSIS**

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIERREZ: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/658-7777

### **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Conservar en su envase original en lugar seco a temperatura inferior a 30 °C.

### **PRESENTACIONES**

Envases conteniendo 10, 20, 30 y 40 comprimidos gastrorresistentes para la venta al público.

Envases conteniendo 100, 200, 400, 500 y 1000 Comprimidos Gastrorresistentes para uso Hospitalario Exclusivo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N° 55919

### **LABORATORIO ECZANE PHARMA S.A.**

LAPRIDA 43, AVELLANEDA, PCIA. DE BS.AS., ARGENTINA.

TELEFONOS: (54)11-4222-3494/ FAX: (54) 11-4201-2587

DIRECTOR TÉCNICO JOSÉ LUIS CAMBIASO. FARMACÉUTICO.

ELABORADO EN VIRGILIO 844 CABA.

 Laboratorio  
**Eczane**