

CARBOMAX®

FTALILSULFATIAZOL - CARBON

COMPRIMIDOS

Industria Argentina

Venta bajo receta

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA:

CARBOMAX®

Cada comprimido contiene:

Ftalilsulfatiazol	500,00 mg
Carbón activado	200,00 mg
PVP K30	44,00 mg
Croscaramelosa sódica	3,60 mg
Lactosa	80,00 mg
Almidón glicolato de sodio (Primojel)	30,00 mg
Estearato de magnesio	7,00 mg

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antidiarreico antiinfeccioso intestinal. Adsorbente. Antiflatulento.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Antiséptico intestinal con propiedades absorbentes

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

Ftalilsulfatiazol y Carbón Activado:

Tienen acción tópica a nivel de la luz intestinal o cutánea y no se absorben cuando son administrados por vía oral

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Para alivio sintomático de diarrea y flatulencias

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Adultos: 1 o 2 comprimidos cada 4 a 6 horas durante el 1er día de tratamiento luego ir disminuyendo la dosis a intervalos de 8 y 12 horas.

De continuar la diarrea luego de los 3 días de tratamiento reevaluar el diagnóstico y conducta terapéutica.

Niños mayores de 6 años: ½ a 1 comprimido cada 4 a 6 horas durante el 1er día de tratamiento luego ir disminuyendo la dosis a intervalos de 8 y 12 horas.

De continuar la diarrea luego de los 3 días de tratamiento reevaluar el diagnóstico y conducta terapéutica.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los componentes de la fórmula.

Embarazo.

Lactancia.

ADVERTENCIAS:

Duración del tratamiento limitado a 3 días.

Informar a los pacientes la necesidad de medidas dietéticas y de rehidratación (De acuerdo a la intensidad del cuadro diarreico, edad y condición del paciente)

PRECAUCIONES GENERALES:

No se deje al alcance de los niños.

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:

No utilizar en esos casos

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Constipación. Heces negras u oscuras.

Interacción medicamentosa y de otro genero:

No se han encontrado

Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio:

No se han encontrado

Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad:

No se han encontrado.

SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666

- Hospital A. Posadas:

(011) 4654-6648 ó (011) 4658-3001 al 20 ó 0-800-333-0160

- Centro de asistencia toxicológica La Plata:

(0221) 451-5555

- Optativamente otros centros de intoxicaciones

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación:

Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y descartados la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito provocado o lavado gástrico, carbón activado, purgante salino (45 a 60 min. luego del C.A.), hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.

CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C, ALEJADO DE LA LUZ INTENSA Y DENTRO DE SU ENVASE ORIGINAL.

PRESENTACIÓN:

CARBOMAX® Comprimidos se presenta en envases por 5, 10, 20, 30 comprimidos para la venta al público y 100, 250, 500 y 1000 para uso exclusivo de instituciones.-

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado Nro. 56.043

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Laboratorio ECZANE PHARMA S.A.

Laprida 43

Avellaneda

Provincia de Buenos Aires.

Tel Fax: 011-4201-2587

Dirección Técnica: José Luis Cambiaso - Farmacéutico

Elaborado en Virgilio 844- CABA