



EVALDIX®

Tarjeta recordatoria para el paciente

- » Recuerde que si tiene presión alta debe comunicar al médico los medicamentos que está tomando.
- » Recuerde que si tuvo hepatitis anteriormente debe comunicarle al médico.
- » Recuerde que si es un paciente VIH positivo debe comunicárselo al médico.
- » Recuerde que si es un paciente psiquiátrico o toma medicación psiquiátrica debe comunicárselo al médico.
- » Recuerde que si presenta signos y síntomas de infecciones es necesario notificarlos inmediatamente al médico durante el tratamiento con Evaldix® y hasta dos meses después de su interrupción.
- » Recuerde notificar inmediatamente al médico cualquier síntoma de alteración hepática durante el tratamiento con Evaldix® y hasta doce meses después de finalizar el tratamiento.
- » Recuerde que Evaldix® es teratogénico y por ello las mujeres en edad fértil deben:
 - Realizarse una prueba de embarazo.
 - Estar utilizando un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Evaldix® y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
 - Notificar inmediatamente al médico cualquier embarazo (intencionado o no intencionado) durante el tratamiento con Evaldix® y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
- » Recuerde la necesidad de una prueba de la función hepática antes de iniciar el tratamiento y de la monitorización de la función hepática a los meses 1, 3, 6, 9 y 12 durante el tratamiento con Evaldix® y posteriormente de forma periódica.

Anexo 3- PGR Evaldix. Versión 10.0
DIV4600006



LABORATORIO ECZANE PHARMA SA

Laprida 43, Avellaneda Provincia de Buenos Aires. Tel: (011) 4222-3494
informes@eczane.com.ar www.eczane.com.ar