



## GLADIER®

### Tarjeta recordatoria para el paciente

- » Recuerde que se le va a realizar un ECG al inicio y se le va a medir la presión arterial antes de la primera dosis de Gladier®.
- » Recuerde que es necesario monitorizar su corazón por 6 o más horas después de la primera dosis de Gladier®, incluyendo el control del pulso y de la presión arterial cada hora. Los pacientes podrían ser monitorizados con un ECG continuo durante las primeras 6 horas. Necesitarán un ECG a las 6 horas y en algunas circunstancias la monitorización supondrá la pernoctación en un centro médico.
- » Recuerde llamar a su médico en caso de interrumpir el tratamiento ya que la monitorización de la primera dosis puede tener que repetirse dependiendo de la duración de la interrupción y el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento con Gladier®.
- » Recuerde notificar inmediatamente al médico los síntomas que indican un ritmo cardíaco lento (tales como mareo, vértigo, náuseas o palpitaciones), después de la primera dosis de Gladier®.
- » Recuerde que Gladier® no está recomendado en pacientes con enfermedad cardíaca o en aquellos pacientes que toman concomitantemente medicamentos que se sabe que disminuyen el ritmo cardíaco y deben informar a cualquier médico que visiten que ellos están en tratamiento con Gladier®.
- » Recuerde que si presenta signos y síntomas de infecciones es necesario notificarlos inmediatamente al médico durante el tratamiento con Gladier® y hasta dos meses después de su interrupción.
- » Recuerde notificar inmediatamente al médico cualquier síntoma de alteración visual durante el tratamiento con Gladier® y hasta dos meses después de finalizar el tratamiento.
- » Recuerde que Gladier® es teratogénico y por ello las mujeres en edad fértil deben:
  - Realizarse una prueba de embarazo.
  - Estar utilizando un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Gladier® y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
  - Notificar inmediatamente al médico cualquier embarazo (intencionado o no intencionado) durante el tratamiento con Gladier® y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
- » Recuerde la necesidad de una prueba de la función hepática antes de iniciar el tratamiento y de la monitorización de la función hepática a los meses 1, 3, 6, 9 y 12 durante el tratamiento con Gladier® y posteriormente de forma periódica.

Anexo 3- PGR Gladier. Versión 10.0  
DIV4600010v2



LABORATORIO ECZANE PHARMA SA

Laprida 43, Avellaneda Provincia de Buenos Aires. Tel: (011) 4222-3494  
informes@eczane.com.ar www.eczane.com.ar