

APARZO

Loratadina 10 mg

Comprimido – Vía oral

Industria Argentina

Venta libre

POR FAVOR, LEA CON CUIDADO TODO EL PROSPECTO ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO.
CONSERVE ESTE PROSPECTO, YA QUE PUEDE TENER QUE LEERLO NUEVAMENTE.

QUE CONTIENE ESTE PRODUCTO

Composición de APARZO:

El principio activo es loratadina. Cada comprimido contiene 10 mg de loratadina. Los demás componentes (excipientes) son: Lactosa monohidrato, almidón de maíz y estearato de magnesio

ACCION

Antihistamínico (antialérgico)

QUE NECESITA SABER ANTES DE TOMAR APARZO

No tome APARZO:

-Si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento

QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Si padece de insuficiencia hepática o renal grave; consulte con el médico.

El uso de este producto deberá interrumpirse al menos de 48 hs antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden alterar los resultados de las mismas.

Algunos medicamentos como los utilizados para tratar la depresión, las infecciones por hongos y algunos antibióticos como la eritromicina, pueden aumentar los niveles de loratadina, aumentando los efectos adversos consulte con su médico.

Si sufre de ataques de agudos de asma, consulte a su médico.

No consuma alcohol mientras toma este producto, ya que puede potenciar los efectos adversos. En caso de alergia grave con dificultad respiratoria o hinchazón de cara y/o manos consultar con el médico.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO

Puede producir cansancio, sedación, adormecimiento, fatiga, palpitación, alergias cutáneas y náuseas.

En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo.

Si los síntomas alérgicos persisten por más de 5 días, empeoran o aparecen síntomas diferentes a los iniciales, consulte a su médico.

CONDUCCION Y USO DE MAQUINARIAS

Observe su respuesta a la medicación, ya que puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas.

Si fuera así, absténgase de conducir y operar maquinarias peligrosas.

QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR APARZO

No use este medicamento en caso de alergia conocida a la loratadina o a alguno de los excipientes.

No use este medicamento si sufre de intolerancia a la galactosa hereditaria, una deficiencia de lactasa o una mala absorción de glucosa-galactasa, por su contenido de lactosa.

No use este medicamento si está embarazada o dando pecho a su bebé. Niños menores de 12 años

COMO TOMAR APARZO

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mg (1 comprimido) una vez al día. El comprimido puede ingerirse con o sin alimentos.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días interrumpidos.

QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOME MAS CANTIDAD DE LA QUE NECESITO

Si usted toma más Aparzo del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o con el hospital más cercano.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ 4658-7777

SI OLVIDO TOMAR APARZO

Si olvidó tomar su dosis a tiempo, tómela lo antes posible, y luego vuelva a su pauta de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

COMO CONSERVAR APARZO

Conservar a temperatura ambiente menor a 30°C. Proteger de la luz

Mantener Fuera Del Alcance De Los Niños

PRESENTACION

APARZO - Loratadina 10 mg: Envase por 10 y 20 comprimidos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 59.510

LABORATORIO ECZANE PHARMA SA.

www.eczane.com.ar

Laprida 43-Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Tel: (011)5263-9727

Dirección Técnica: Farmacéutico Jose Luis Cambiaso.

Elaborado en Dean Funes 353 – Avellaneda.

última revisión: Abril del 2022.