

PARAXAMOL

Paracetamol 500 mg – 650 mg

Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

1. QUÉ ES PARAXAMOL Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Paraxamol es analgésico y antipirético. Se utiliza para el tratamiento sintomático del dolor moderado a leve, para estados gripales y febriles.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR PARAXAMOL?

NO TOME PARAXAMOL

- Si es alérgico a paracetamol o a alguno de los demás componentes.
- No inicie el tratamiento si la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.
- Si padece de ulcera péptica activa. Antecedentes de ulcera recurrente.
- Si padece alguna enfermedad hepática, hepatitis viral, trastorno renal o alcoholismo.
- Si padece enfermedad de riñón, corazón o del pulmón
- Si tiene anemia (disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre, a causa o no de una disminución de glóbulos rojos)
- Si tiene enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la probabilidad de sangrado, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- En niños menores de 12 años consulte a su médico o farmacéutico ya que existen otras presentaciones con dosis que se adaptan a este grupo de pacientes.

Toma de Paraxamol con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Paraxamol puede tener interacciones con los siguientes medicamentos

- Antibióticos (cloranfenicol)
- Anticoagulantes (utilizados para el tratamiento de enfermedades tromboembólicas)
- Antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de las crisis epilépticas)
- Anticonceptivos
- Diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina)
- Isoniazida (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis)

- Lamotrigina (utilizado para el tratamiento de la epilepsia)
 - Probenecid (utilizado para el tratamiento de la gota)
 - Propanolol (utilizado para el tratamiento de la hipertensión, arritmias cardíacas)
 - Rifampicina (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis)
 - Anticolinérgicos (utilizados para el alivio de espasmos o contracciones de estómago, intestino y vejiga)
 - Zidovudina (utilizado para el tratamiento de las infecciones por VIH)
 - Colestiramina (utilizado para disminuir los niveles de colesterol en sangre)
- No utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor) sin consultar al médico.

Interacciones con pruebas de diagnóstico

Consultar con el médico si tiene que someterse a un análisis de sangre u orina, ya que puede alterar los resultados de ciertas pruebas de laboratorio.

3. CÓMO TOMAR PARAXAMOL

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento debe tomarse por vía oral. Según sus preferencias, los comprimidos se pueden ingerir con agua, leche o zumo de frutas.

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: la dosis habitual es de 1 comprimido 3-4 veces al día. Las tomas deben espaciarse al menos 4 horas. No se tomarán más 4 gramos en 24 horas.

Tomar el comprimido entero (no partir)

Si el dolor se mantiene durante más de 5 días y/o la fiebre más de 3 días o bien el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, hay que interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Si toma más Paraxamol del que debe:

Paraxamol puede causar daño hepático en dosis altas.

Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o que padezcan alcoholismo crónico pueden ser más susceptibles a una sobredosis de paracetamol.

Si usted ha tomado más paracetamol del que debe, consulte inmediatamente a su médico o al Servicio de Información Toxicológica. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología. Hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Si se ha tomado una sobredosis, debe acudir inmediatamente a un centro médico aunque no haya síntomas, ya que a menudo no se manifiestan hasta pasados tres días de la toma, aún en casos de intoxicación grave. Los síntomas por sobredosis pueden ser: mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, paracetamol puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los más comunes son erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones de la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Ante cualquier inconveniente con el producto puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

5. CONSERVACIÓN DE PARAXAMOL

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente menor a 25°

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

El principio activo es paracetamol, los demás componentes son Almidón pregelatinizado, Povidona (PVP K30) y Acido esteárico.

Aspecto del producto y contenido del envase

7. PRESENTACION

Paraxamol 500 mg: Envases por 10, 20 o 30 comprimidos redondos en blíster de Alu/PVC; y Envases por 400 y 500 comprimidos redondos en dispenser.

Paraxamol 650 mg Envases por 10, 20 o 30 comprimidos oblongos en blíster de Alu/PVC; y y Envases por 400 y 500 comprimidos redondos en dispenser.

Mantener fuera del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente menor a 25°C

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 60.111

LABORATORIO ECZANE PHARMA SA

www.eczane.com.ar

Laprida 43 - Avellaneda Provincia de Buenos Aires

Tel: (011) 5263-9727

Dirección Técnica: Farmacéutico José Luis Cambiaso

Última revisión: septiembre 2024.